

CAGE-AID 질문지

CAGE-AID는 알코올에만 국한되었던 CAGE 질문지의 각 항목의 초점을 알코올과 **향정신성 약물(마약성 진통제 포함)**을 포함하도록 확대시킨 결합 질문지입니다.

● 환자 성명:

● 방문 날짜:

- 향정신성 약물(마약성 진통제 포함) 사용에 대해 생각할 때, 불법적인 향정신성 약물 사용 및 처방 받은 (용법) 것 이외의 사용을 모두 포함시켜 주시기 바랍니다.

질문	예	아니오
1. 귀하는 귀하의 음주 또는 향정신성 약물 (마약성 진통제 포함) 사용을 줄여야 한다고 느낀 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 사람들이 귀하의 음주 또는 향정신성 약물 (마약성 진통제 포함) 사용에 대해 비난하여서 귀하를 짜증나게 한 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 귀하는 귀하의 음주 또는 향정신성 약물 (마약성 진통제 포함) 사용에 대해서 나쁘게 느끼거나 죄의식이 든 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 귀하는 신경을 안정시키거나 숙취를 제거하기 위해 아침에 첫 번째로 한 일이 음주 또는 향정신성 약물 (마약성 진통제 포함) 의약품 사용이었던 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• 임상적 유용성

잠재적인 장점은 알코올 및 **향정신성 약물** 문제를 개별적으로가 아니라 결합하여 스크리닝 할 수 있다는 것입니다.

• 채점

CAGE-AID에 대한 하나 또는 그 이상의 양성 답변을 양성 스크리닝으로 간주합니다.

• 정신측정학적 특성

CAGE-AID 작성 결과 ¹	민감도	특이도
'예' 라는 답변이 한 개 이상임	0.79	0.77
'예' 라는 답변이 두 개 이상임	0.70	0.85

마약류

Codeine phosphate: 코데인 정, 타코펜, 마이폴 등
 Oxycodone hydrochloride: 타진서방정, 옥시코넨 서방정, 아이알코돈, 오코돈 등
 Fentanyl: 펜타닐 패치, 속효성 펜타닐 (액틱, 펜토라, 앵스트랄, 인스타닐 등)
 Morphine hydrochloride: 염몰핀, 황몰핀 등
 Hydromorphone hydrochloride: 저니스타, 딜리드 등
 Pethidine hydrochloride: 페치딘 주, 메페리딘 등

향정신성의약품

Alprazolam: 알프라람정
 Clonazepam: 리보트렐정
 Lorazepam: 아티반
 Triazolam: 할시온
 Diazepam: 디아제팜
 Flunazepam: 달마돔 정

Zolpidem: 졸피드 정
 Phenobarbital: 페노바르비탈
 Midazolam: 바스캅 주
 Ketamine hydrochloride: 케타민
 Buprenorphine: 노스판 패치
 Propofol: 아네폴 주

¹ Brown RL, Rounds LA. Conjoint screening questionnaires for alcohol and other drug abuse: criterion validity in a primary care practice. Wisconsin Medical Journal. 1995;94(3) 135-140.

CAGE-AID 질문지

CAGE-OPIOID는 알코올에만 국한되었던 CAGE 질문지의 각 항목의 초점을 마약성 진통제에 대해서 적용하도록 수정한 질문지입니다

● 환자 성명:

● 방문 날짜:

- 질문지 작성시 마약성 진통제를 의사의 처방 없이 복용하였거나 의사의 처방 대로 복용하지 않은 경우를 함께 고려하여 작성하시기 바랍니다.

질문	예	아니오
1. 귀하는 귀하의 마약성 진통제 복용을 줄여야 한다고 생각한 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 사람들이 귀하의 마약성 진통제 복용에 대해 비난하는 것이 귀하를 언짢게(짜증나게) 한 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 귀하는 귀하의 마약성 진통제 복용에 대해서 나쁘다고 느끼거나 이에 대하여 죄책감이 든 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 귀하는 신경 안정이나 기분의 개선을 위해서 아침에 첫 번째로 한 일이 마약성 진통제의 복용 이었던 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• 임상적 유용성

잠재적인 장점은 마약성 진통제 사용으로 인한 부작용을 평가할 수 있다는 것입니다..

• 채점

CAGE-OPIOID에 대한 하나 또는 그 이상의 양성 답변을 양성 소견으로 간주합니다.