Supplemental Figure 2: Subgroup Forest Plot Frequency

	Patients(%)	Reduction in %		Additional Reduction in % (Frequency) CBT vs. AC (95% CI)	P-Value for Interaction
		CBT	AC		
Sex					
male	55(43.3)	56.21	28.41	63.48 (6.06 to 151.99)	
female	72(56.7)	21.44	36.04	-18.58 (-43.55 to 17.45)	0.016
Age					
7-9 years	55(43.3)	39.32	34.43	8.07 (-29.94 to 66.71)	
10-13 years	72(56.7)	37.35	32.81	7.25 (-27.50 to 58.65)	0.980
Socioeconomic Status					
lower	11(8.7)	40.88	-5.48	78.40 (-41.68 to 445.72)	
middle	103(81.1)	35.47	39.83	-6.75 (-31.95 to 27.77)	
upper	13(10.2)	52.13	8.62	90.88 (-26.40 to 395.06)	0.225
Psychiatric Strain					
GSI <= 59	113(89.0)	36.21	38.86	-4.15 (-28.98 to 29.35)	
GSI > 59	14(11.0)	87.11	10.69	592.77 (94.00 to 2373.90)	0.009
Parental Pain					
No	46(36.2)	49.06	31.92	33.65 (-17.15 to 115.59)	
Yes	81(63.8)	30.80	34.73	-5.68 (-34.30 to 35.41)	0.265
Psychological Strain					
unobtrusive	84(67.7)	40.26	23.69	27.74 (-10.16 to 81.63)	
marginal	19(15.3)	6.42	41.65	-37.65 (-70.91 to 33.65)	
conspicuous	21(16.9)	59.78	50.02	24.25 (-40.10 to 157.72)	0.253
All patients	**127**	**38.40**	**33.80**	**7.46 (-19.48 to 43.43)**