


Figure 1. Patient Shared Decision-Making Tool: Cervical Cancer Screening Tool in English



Name _____

Date of birth _____

Date of clinic visit _____

Cervical Cancer Screening
 Twelve thousand women a year are diagnosed with cervical cancer in the United States and 4,000 women a year die due to cervical cancer. 93% of all cervical cancers can be prevented through regular screening, early detection, and HPV vaccination.

1. Have you ever been screened for cervical cancer (had a pap test)?

Yes

No

2. If you had a pap test, when was your last one? _____

3. Do you know about the Well-Woman Healthcheck program? _____

It is recommended that women ages 21-29 should get a pap test every three years and women ages 30-65 should get a pap test with HPV testing every five years. Women should continue getting regular women’s health visits even when they are not due for a pap.

4. I am due for a woman’s health visit and will get one today or make an appointment before leaving the clinic.

I am never interested in a women’s health visit at all.	I am not ready to have a visit or make an appointment.	I want to think about it more.	I support having a women’s health visit but am not due today.	I want to get a women’s health visit or make an appointment today.

Figure 2. Patient Shared Decision-Making Tool: Cervical Cancer Screening Tool in Spanish



Nombre _____

Fecha de nacimiento _____

Fecha de su cita _____

Detección del Cáncer de Cuello Uterino

Doce mil mujeres al año son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en los Estados Unidos y 4.000 mujeres mueren cada año debido al cáncer de cuello uterino. El 93% de todos los cánceres de cuello uterino se pueden prevenir a través de exámenes regulares, detección temprana y vacunación contra el VPH.

1. ¿Alguna vez ha sido examinado por cáncer de cuello uterino? (Tuve una prueba de Papanicolaou).

Sí

No

2. Si se hizo una prueba de Papanicolaou, ¿cuándo fue la última? _____

3. ¿Conoces el programa Well-Woman Healthcheck? _____

Lo recomendado es que las mujeres de entre 21 y 29 años deben hacerse una prueba de Papanicolaou cada tres años y las mujeres de 30 a 65 años deben hacerse una prueba de Papanicolaou con una prueba de VPH cada cinco años. Las mujeres deben continuar recibiendo visitas regulares de salud de la mujer, incluso cuando no se les debe hacer una prueba de Papanicolaou.

4. Marca uno, por favor:

Nunca estoy interesado en una visita de salud de la mujer en absoluto.	No estoy listo para hacer una visita o concertar una cita.	Quiero pensarlo más.	Apoyo la visita a la salud de la mujer, pero no vence hoy.	Deseo recibir una visita de salud de la mujer o concertar una cita hoy.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>